

登革熱 Bye Bye!

全嘉孳清總動員



巡視室內外積水容器



倒掉積水、倒置容器



容器減量清除孳生源



刷掉蚊蟲卵

注意!

孳生源不消除

要開罰!

查獲孳生源開立改善單，限期未改善依傳染病防治法處

新臺幣3000 ~ 15000元

防蚊4寶



室內外有無
積水容器



掉積水
將容器倒置



洗容器
清除蟲卵



除孳生源
容器減量

常見積水容器孳生源



保麗龍箱



瓶罐、桶



大型帆布



輪胎



嘉義縣政府



嘉義縣衛生局

關心您

登革熱快篩



助診斷 早治療
登革熱NS1抗原快速診斷試劑



出現症狀 速就醫



請做好**保護措施**
避免病媒蚊叮咬



NS1試劑 輔助診斷

公費NS1快篩合約醫療院所



及時**適當臨床處置**



嘉義縣政府



嘉義縣衛生局·關心您

112/07/20



登革熱 要注意!!

常見症狀

- ✓ 高燒
- ✓ 頭痛
- ✓ 後眼窩痛
- ✓ 肌肉痛
- ✓ 關節痛
- ✓ 出疹



防蚊四寶



『巡檢』社區環境
有無積水



戶內外積水要
『清除』



發現積水容器應主
動將容器『倒置』



家戶盛水容器
常『刷洗』

曾至疫區或
旅遊請注意



如有上述症狀，請儘速就醫



颱風後防疫4要點

1 穿著防水鞋、手套
避免直接接觸污水



3 使用肥皂水刷洗
稀釋過漂白水環境擦拭

居家環境消毒

▶ 稀釋漂白水
泡製方式(以市售漂白水次氯酸鈉濃度5%計算)

1:100 泡製：一般環境消毒
【 10cc 漂白水 + 1000cc 清水 】

可以用藥瓶上蓋的量杯

The diagram shows a small measuring cup labeled '10cc' containing a dark liquid, followed by a plus sign and two larger measuring cups, each labeled '500cc', containing a lighter liquid. This illustrates the 1:100 dilution ratio.

2 清除垃圾及積水容器
防止病媒蚊孳生



4 飲用水需煮沸再飲用
飲食以熟食為主

